

Sanierungsschema bei MRSA- Keimträgerschaft

Screening-relevante MRSA-Risikofaktoren nach KRINKO

1. Patienten mit bekannter MRSA-Anamnese
2. Patienten aus Regionen / Einrichtungen mit bekannt hoher MRSA-Prävalenz
3. Patienten mit einem stationären Krankenhausaufenthalt (> 3 Tage) in den zurückliegenden 12 Monaten
4. Patienten die (beruflich) direkten Kontakt zu Tieren in der landwirtschaftlichen Tiermast haben
5. Patienten, die während eines stationären Aufenthalts Kontakt zu MRSA-Trägern hatten
6. Patienten mit zwei oder mehr der folgenden Risikofaktoren: Chronische Pflegebedürftigkeit; Antibiotikatherapie in den zurückliegenden 6 Monaten; liegende Katheter (z. B. Harnblasenkatheter, PEG-Sonde); Dialysepflichtigkeit; Hautulkus, Gangrän, chronische Wunden, tiefe Weichteilinfektionen

Durchführung

Sanierungsbereich	Nasenvorhöfe	Mund- und Rachenraum	Ganzkörperwaschung von Haut und Haaren	Infizierte Wunden	Sonstiges
Wirkstoffe	Mupirocin Bacitracin Octenidin Polihexanid PVP-Jod	Chlorhexidin Polihexanid Octenidin Hexetidin	Chlorhexidin Polihexanid Octenidin Triclosan	Polihexanid Octenidin Silber PVP-Jod Biochirurgie	Tägl. Bekleidung, Textilien und Gegenstände, die mit Haut oder Schleimhaut Kontakt haben wechseln (Bettwäsche, Utensilien der Körperpflege - Handtücher, Waschlappen, Einmalkämme, Einmalzahnbürste, Einmalrasierer etc.)
Tage					
1	3x täglich	2-3x täglich	2-3x täglich	1-3x täglich	
2	3x täglich	2-3x täglich	2-3x täglich	1-3x täglich	
3	3x täglich	2-3x täglich	2-3x täglich	1-3x täglich	
4	3x täglich	2-3x täglich	2-3x täglich	1-3x täglich	
5	3x täglich	2-3x täglich	2-3x täglich	1-3x täglich	
6	Pause				
7	Pause				
8	Pause				
9	1. Kontrollabstrich				
10	2. Kontrollabstrich				
11	3. Kontrollabstrich				
	Abstrich negativ = Sanierung abgeschlossen, 2. Kontrolle zwischen 3 und 6 Monaten und abschließend 3. Kontrolle nach 12 Monaten Abstrich positiv = neuer Sanierungszyklus				

Zusätzliche Informationen zur Sanierung bei MRSA finden Sie im Merkblatt *Informationen zur Sanierung und Umgebungsdekontamination einer MRSA Keimträgerschaft: Merkblatt für Patienten* auf der Homepage des MRE-Netzwerks unter www.mre-netzwerk-bw.de.